

Vorgehen bei Mitarbeitenden Spital und PZS nach Kontakt zu COVID-19 Fällen oder bei Symptomen

Kontakt Kriterien

Enger Kontakt zu einem laborbestätigt Fall ohne (adäquate) persönliche Schutzmassnahmen=

- Kontakt von <2m während >15 min
- Krankenpflege
- Direkter Kontakt mit Atemwegssekreten oder Körperflüssigkeiten
- Wohnen im gleichen Haushalt

oder

Beschwerde Kriterien

Symptome eine akuten Erkrankung der Atemwege, z.B.

- Husten
- Schnupfen, Halsschmerzen
- Atemnot und/oder
- Fieber (kann bei einigen Patienten auch fehlen)

ja

Nein, aber allgemeine Fragen:

- Intranet: Konzept Coronavirus oder veronika.mathys@spitalaffoltern.ch
- Internet BAG, Infoline BAG: 058 463 00 00

ja

Exponiert zu COVID-19

Falls unklar genauere telefonische Anamnese durch Notfall
Notfallarzt: Tel 3300 oder Notfallpflege Tel 2620

Möglicher COVID-19 Verdachtsfall

Falls unklar genauere telefonische Anamnese durch Notfall
Notfallarzt: Tel 3300 oder Notfallpflege Tel 2620

Ohne Symptome

- Dürfen weiterarbeiten solange asymptomatisch
- Tragen im Betrieb für 14 Tage ab letzter Exposition eine chirurgische Maske + sorgfältige Händehygiene
- Selbst – Monitoring und Selbstquarantäne extern während dieser Zeit

Mit leichten Symptomen, arbeitsfähig

- Kontakt mit Notfall → Abstrich
- weiterarbeiten
- Tragen im Betrieb eine chirurgische Maske + sorgfältige Händehygiene
- Bei Verschlechterung im Verlauf erneute Triage

Bei Auftreten von Symptomen

- Sofortige Selbstisolation, Kontakt mit Notfall → Abstrich
- Falls zur Zeit im Betrieb: Test auf Notfall nach Voranmeldung
- Falls zur Zeit extern: Test durch HA, Notfall oder nahe Institution

Mit klaren Symptomen und/oder arbeitsunfähig

- Sofortige Selbstisolation, Falls zur Zeit im Betrieb: Test auf Notfall nach Voranmeldung
- Falls zur Zeit extern: Test durch HA, Notfall oder nahe Institution

Nasopharynx – Abstrich

Testergebnis negativ

- Weiterarbeiten mit chirurgischer Maske

Testergebnis positiv = COVID -19 Fall

- Selbstisolation (siehe Formular BAG)
- Ende Isolation: 48h nach Symptomende, sofern seit Symptombeginn mindesten 10 Tage verstichen.

Transport : keine ÖV: zu Fuss, privater PW mit bereits exponierter Kontaktperson, Ambulanz falls nötig